


MASCHINE, MENSCH ODER KUH? – WO DRÜCKT DER SCHUH?

Die häufigsten Ursachen für Mastitis in der
Melkberatung

26.09.2025 | Afema | Anton Huber LKV Bayern |




- **Technik**
- **Melkarbeit**
- **Haltung**
- **Futterhygiene**



→ Ziel: Finden und Abstellen der Ursachen für Mastitis

- Allgemeine Probleme
 - Pulsation
 - Reserveluft
- Fehlende Wartung
 - Techniker sind zu wenig
 - Haben keine Zeit
- Zitzengummis
 - Nicht passende Zitzengummis
→ Speziell bei Fleckvieh




- Fehlende Stimulation
 - Führt zu frühzeitigem Klettern
 - Maschinelle Stimulation ist nicht immer gut
 - Zeit?
 - Positionierung
- Hohe Abnahmeschwellen
 - Vor allem bei Robotern durch Firmenkonkurrenz




shutterstock.com - 2272829385

Melkbereitschaft durch AnrÜsten





- Abmelkende masch. Vorphase
- Lufteinbruch am Stufeneuter
- Niedriges Niveau nach Repositionierung



- Liegeboxenhygiene
 - Möglichst trocken
 - Möglichst sauber
 - Möglichst bequem



- Betriebsgrößen
- Arbeitskraftsituation
- Zeitmangel

Einstreu, Einstreu, Einstreu...



- Größter Anteil der Probleme treten mit Umweltkeimen auf
- Stroh saugt das sechsfache des Eigengewichts auf
- Einstreu nimmt die Reibung von den Gelenken und fördert so die Bequemlichkeit
- Kalk ?



- „Grundnahrungsmittel“
- Frei von Keimen und deren Giften
- Desinfektion?
- Einfache Reinigung?
- Je 20 Kühe eine Trogtränke
- Durchfluss



- Schmutzbeläge werden oft unterschätzt
- Führen oft zu Nacherwärmungen
- Schimmel, Hefen und Fäulnisbakterien
- Sanierung mit Acrylaten (Trockenzeit beachten)
- Edelstahl auch möglich



- Offene Silos ohne Überdachung
- Greifschaufeln
- Wechselhaftes Wetter
- Zeitmangel
- Maschinisierung
- Gifte verursachen eine Immunschwäche



Danke für die
Aufmerksamkeit!

