Effizienz vs. Romantik

Was können unsere Kühe leisten?

Prof. Dr. Josef J. Gross

Veterinär-Physiologie
Vetsuisse Fakultät
Universität Bern, Schweiz

Warum geben Kühe Milch?

Aufgaben der Laktation in der Brutpflege

- Ernährung des Neugeborenen + Kuh-Kalb-Bindung durch Saugen
 - ➔ Hohe Stoffwechselfriorität der Milchproduktion
- Kolostrum: Passive Immunisierung beim Kalb (alle Ungulaten)
 - ➔ Hohes Niveau Milchsekretion bereits zur Abkalbung

Laktation des Wiederkäuers in der Evolution: Bedeutung für das Kalb in der Früh- und Spätlaktation

Züchterisch bedingte hohe Milchmenge beruht auf der genetisch bedingten Priorisierung der Nährstoffversorgung für das Euter

Neuer "Konsument" mit grösserem Bedarf, aber unveränderte Funktionsweise.

u^b

^b
UNIVERSITÄT
BERN

Milchproduktion bei Kühen steigt weiter.

- Aktuell keine Leistungsgrenze der Milchdrüse in Sicht.

Aber:

- Energie und Nährstoffe müssen für das Euter verfügbar sein
- Exterieur, Gesundheit und Stoffwechsel der Kuh müssen zum Euter passen

Produktionserkrankungen

- Überwiegend in der Früh lactation (negative Energiebilanz!)
- Beeinträchtigung des Immunsystems
- Stoffwechsel- und Infektionserkrankungen

Beispiele:

- Ketose
- Mastitis
- Lahmheit
- Labmagenverlagerung
- Fruchtbarkeitsprobleme
- (Störungen Mineralstoffhaushalt: Festliegen - Gebärparese, ...)
- usw.

Die Züchtung hat die Anforderungen an den Stoffwechsel massiv erhöht

Energiebedarf bei verschiedenen Spezies für Laktation und Wachstum (MJ ME/Tag)

	Erhaltungs- bedarf	Leistungsbedarf	Gesamtbedarf
Kuh, 25 kg milk/d	60	130	190
Sau, 7 kg milk/d	22	50	72
Mensch, 0.9 kg milk/d	9.1	3.6	12.7
Mastbulle, 1000 g/d ADG	55	33	88
Menschl. Baby, 50 g/d ADG	1.4	1.0	2.4
Sportler/Kletterer, 1000 m	9	5	14

Die Züchtung hat die Anforderungen an den Stoffwechsel massiv erhöht

Selz-Pralle Aftershock 3918:
39'489 kg Milch (365 Tage, 3. Laktation)
→ 108 kg/Tag!

1,405 kg Fett
1,086 kg Eiweiss
Aktuelle Lebensleistung: 138'000 kg Milch

Grenzen nicht für das Euter, aber für die Kuh

Die Kuh ist ein Wiederkäuer:

- Limitierte Energiedichte wegen notwendigem Faseranteil
- Pansengeschützte Nährstoffe teuer und nur teilweise ausreichend
- Krafftutter zur Kompensation des Nährstoffdefizits sollen nicht im Pansen abgebaut werden. Entsprechende Produkte müssen meist importiert werden (z.B. Soja-Protein)
- Hormonale Regulation, Stoffwechsel und Immunsystem der Kuh scheinen teilweise an die Grenzen zu stossen.
→ Vermehrt Reproduktionsprobleme, Stoffwechselerkrankungen, Infektionskrankheiten

Start in die Laktation

→ Negative
Energiebilanz

Milchproduktion steigt nach der Abkalbung schnell an trotz Energie- und Nährstoffdefizit (Priorität der Milchdrüse)

Die Rolle der Glucose für die Milchproduktion

Mit Einsetzen der Laktation werden über 80 % der Glucose in der Milchdrüse verbraucht:

- **Energiequelle:** kann teilweise eingespart und durch andere Energiequellen (Fettsäuren!) ersetzt werden
- **Substrat für Lactose-Synthese:** **Glucose kann nicht ersetzt werden**

Glucose wird durch verschiedene membrangebundene Transporter aus dem Blut in die Milchdrüsenzellen transportiert:

- **GLUT1:** aktiviert unabhängig von Insulin vor allem durch Hypoxie (als Signal für erhöhten Bedarf)
- **GLUT4:** aktiviert durch Insulin (Homöostase)

Aufnahme von Glucose durch die Milchdrüse

Frühlaktation:

- Gerichteter Nährstofffluss zur laktierenden Milchdrüse durch niedriges Insulin
- nur möglich durch Insulin-unabhängige Aufnahme: GLUT1

Spätere Laktation:

- GLUT4 Expression in der Milchdrüse nimmt zu, während GLUT1 abnimmt.
- Glucose-Aufnahme wird zunehmend abhängig von Insulin (Homöostase).

GLUT1
Insulin unabhängig

GLUT4
Insulin abhängig

Verfügbare Glucose bestimmt die Milchmenge

Lactosesynthese und Milchmenge zeigen eine lineare bzw. positive Korrelation mit der

Glucoseaufnahme in die Milchdrüse

(z.B. Nielsen and Jakobsen, 1993; Hurtaud et al., 2000; Kim et al., 2001; Nielsen et al., 2001; Cant et al., 2002; Huhtanen et al., 2002)

Glucose → Lactose → Osmose (H₂O) → Milchmenge

Charakteristische endokrine Anpassungen in der Frühlaktation

Niedriges Insulin:

- Keine Einlagerung von Nährstoffen
- Ungehemmte Lipolyse

Niedriges IGF-1:

- Kein negatives Feedback für GH
- hohes GH → Lipolyse

**Katabole
Stoffwechsellage
(Exzessive) Lipolyse**

Charakteristische metabolische Anpassungen in der Frühlaktation

Marker für metabolischen Stress

Klassisches Modell der Ketogenese

Klassisches Modell der Ketogenese

(Subklinische) Ketose: BHB > 1–1.5 mM

Symptome:

- Verminderte Futteraufnahme
- Reduzierte Glucosekonzentration
- Negative Auswirkungen auf das Immunsystem

Begrenzte Nährstoffversorgung über Ration und Glucose

Ziel:

- Priorisierte Nutzung von BHB im Stoffwechsel?
- Einsparung von Oxaloacetat?

Spezifische Situation bei Milchkühen:

- Nicht nur Energiebedarf, sondern insbesondere hoher spezifischer Glucosebedarf für die Lactose-Synthese.
 - Fast vollständiger Glucose-Abbau aus der Nahrung im Pansen, und keine Bildung von Glucose aus Rohfaser.
- Glucose hauptsächlich aus Neubildung in der Leber (Gluconeogenese)

Experiment: Infusion von BHB

bei Transitzühen vor und nach der Abkalbung

Die BHB Infusion führt in allen Funktionsstadien des Euters zur Abnahme der Plasma-Glucose

Aber: Variation bei Anpassungsreaktionen!

- Versuch mit 45 Kühen im gleichen Betrieb
- wöchentliche Blutproben
- Eingeteilt nach BHB (> 1 mM mindestens einmal)

- Mechanismen weitgehend unbekannt.

- IGF-1 ist ein guter Indikator für den Erfolg der metabolischen Anpassung.

Endokrine und metabolische Anpassung an die Laktation (verschiedene Zuchtlinien)

- Hohe BHB-Konzentration bedeutet eingeschränkte Anpassungsfähigkeit.
- Grosse individuelle Unterschiede der Anpassungsfähigkeit des intermediären Stoffwechsels (Entkopplung der somatotropen Achse unter dem Einfluss von (niedrigem) Insulin (hepatischer GH-Rezeptor)).

- Einfluss der Genetik?

Butler et al., J. Endocrinol. 2003
 Chagas et al., J. Dairy Sci. 2009
 Lucy et al., J. Dairy Sci. 2009
 Grala et al., J. Dairy Sci. 2011
 Ha et al., PlosOne 2015
 Gross & Bruckmaier, J. Dairy Sci. 2019

Analyse Gen-basierter Stoffwechselwege mit Einfluss auf NEFA, BHB und Glucose

Phenotype	Time	Pathways
NEFA	T2	Histidine metabolism
		Sulfur metabolism
	T2/T1	Glycerolipid metabolism
		Glycerophospholipid metabolism
BHBA	T2	Taurine and hypotaurine metabolism
		Retinol metabolism
		Tyrosine metabolism
	T2/T1	Inositol phosphate metabolism
Steroid hormone biosynthesis		
Synthesis and degradation of ketone bodies		
Tryptophan metabolism		
glucose	T2	Inositol phosphate metabolism
		Steroid biosynthesis
		Other glycan degradation
		Fatty acid elongation
	T2/T1	Ether lipid metabolism
		Ether lipid metabolism
		Starch and sucrose metabolism
		Steroid hormone biosynthesis
		Glycerophospholipid metabolism

- Genotypisierung (777k) von 282 Milchkühen
- 3 Rassen (Holstein, Brown Swiss und Swiss Fleckvieh)
- Messung von Stoffwechsellparametern und deren Veränderungen während der Transitphase
- Polymorphismen von verschiedenen Stoffwechselwegen beeinflussen einen oder mehr der 3 Schlüsselmetaboliten.

Stoffwechselstatus und Immunsystem

Reproduktion/Fruchtbarkeit

Einfluss Stoffwechselstatus

IGF-1, Östrogen und Reproduktion

Versuch: Leberdurchblutung und Abbau von exogenem Progesteron

Aktiver Stoffwechsel

- starke Leberdurchblutung
- starker Abbau von Progesteron
- Niedrige Progesteron-Konzentration

Erhöhtes Risiko für

- kurze Brunst, fehlende Symptome
- niedrige Konzeptionsrate
- Embryonaltod

Josef Deegenhart
Schwarzhäuser

Back to nature: Weidefütterung

Hochleistende Milchkühe
bei reiner Grasfütterung
ohne zusätzliches
Krafftter

➔ **Möglichst optimale
Ergänzung mit
Nährstoffen!**

Back to nature: Weidefütterung

- Erhöhtes Risiko für Produktionserkrankungen!
- Leistungsgrenze bei Grasfütterung?
- Bedarfsgerechte Fütterung?
- Tierschutz?

Zusammenfassung: Physiologische Grenzen (1)

- Genetisch bedingte Stoffwechselfriorität der Milchdrüse ist Grundlage für hohe Milchleistungen
- Risiko für unzureichende Stoffwechselfanpassung und Produktionserkrankungen
- Individuelle Unterschiede bei der Stoffwechselfanpassung eröffnen Möglichkeiten zur Zucht auf stoffwechselstabilere Kühe

Zusammenfassung: Physiologische Grenzen (2)

- Negative Nährstoff- und Energiebilanz beeinträchtigen das Immunsystem → Erhöhtes Risiko für Infektionserkrankungen
- Niedrige Glucose- und erhöhte Konzentrationen an freien Fettsäuren und Ketonkörpern können das Immunsystem beeinträchtigen
- Enge Beziehung zwischen Fruchtbarkeit und Stoffwechsellage

August 28-30 2024

Bern, Switzerland

u^b

b
UNIVERSITÄT
BERN

BOLFA & ICFAE

Biology of Lactation
in Farm Animals

International Conference on
Farm Animal Endocrinology

Programm & Anmeldung unter <https://bolfa-icfae.unibe.ch>

Vielen Dank für Eure Aufmerksamkeit!